

Opioidy

1. Opioidowe leki przeciwbólowe

1.1. Pełni agoniści receptorów opioidowych

morfina (Morphini sulfas WZF roztw. do wstrzyk. 10mg/ml, 20mg/ml; Sevredol tabl. 60mg; MST Continus tabl. o przedł. uwaln. 10mg, 30mg, 60mg, 100mg, 200mg; Morphini hydrochloridum – subst. do receptury)

kodeina (Codeini phosphas – subst. do receptury, Codeinum phosphoricum – tabl. 15 mg, 30 mg, 60 mg)

etylomorfina (Ethylmorphini hydrochloridum – subst. do receptury)

fentanyl (Fentanyl WZF roztw. do wstrzyk. 0,05mg/ml amp. a 2ml, Durogesic syst. transdermalny 25µg/h, 50µg/h, 75µg/h, 100µg/h)

Effentora TABLETKI (buccal), fentanyl, sugar-free (as citrate) 100 micrograms, 4-tab pack, 28-tab pack; 200 micrograms, 4-tab pack, 28-tab pack; 400 micrograms, 4-tab pack, 28-tab pack; 600 micrograms, 4-tab pack; 800 micrograms, 4-tab pack, 28-tab pack

sufentanyl

alfentanyl

remifentanyl

metadon TABLETKI, methadone hydrochloride 5 mg, 50 tabletek

oksykodon (Oxycontin – tabl. o przedł. uwaln. 5mg; 10mg; 20mg; 40mg; 80mg) 28 i 56 tabletek w opakowaniu

oksykodon + naloxone

Targinact

-tabletki 5 mg/2.5 mg, f/c, m/r, oxycodone hydrochloride 5 mg, naloxone hydrochloride 2.5mg 28-tab pack

-tabletki 10 mg/5 mg, f/c, m/r, oxycodone hydrochloride 10 mg, naloxone hydrochloride 5mg

56-tab pack

-tabletki 20 mg/10 mg, f/c, m/r, oxycodone hydrochloride 20 mg, naloxone hydrochloride 10mg 56-tab pack

-tabletki 40 mg/20 mg, f/c, m/r, oxycodone hydrochloride 40 mg, naloxone hydrochloride 20mg 56-tab pack

petydyna (Dolargan – inj. amp. 100mg/2ml, Dolcontral – inj. amp. 50mg/ml; 100mg/2ml)

TABLETKI, pethidine hydrochloride 50 mg, 50 tabletek

1.2. Mieszani agoniści/antagoniści receptorów opioidowych

pentazocyna (Fortral – tabl. 50mg; inj. amp. 30mg/ml)

nalbufina

tramadol (Tramal, Poltram – inj. amp. 50mg/ml; 100mg/2ml; czopki 100mg; krople doust. 100mg/ml; kaps. 50mg, tabl. o przedł. uwaln. 50mg; 100mg; 150mg; 200mg)

1.3. Częściowi agoniści receptorów opioidowych

buprenorfina (Bunondol – inj. amp. 0,3mg/ml; tabl. podjęzykowe 0,2mg;
Transtec – TTS 35µg/h; 52,5µg/h; 70 µg/h)

Temgesic®

(Reckitt Benckiser) TABLETKI (sublingual), buprenorphine (as hydrochloride),
200 micrograms, 50-tab pack; 400 micrograms, 50-tab

z naloxonem

Suboxone

Suboxone 2 mg/500 micrograms tablets (sublingual),
buprenorphine (as hydrochloride) 2 mg, naloxone
(as hydrochloride) 500 micrograms, 28-tab 40.

Suboxone 8 mg/2 mg tablets (sublingual), buprenorphine
(as hydrochloride) 8 mg, naloxone 2mg, 28-tab pack

1.4. Pełni antagoniści receptorów opioidowych

nalokson (Naloxonium hydrochloricum – inj. amp. 0,4mg/ml)

naltrekson

Naltrexone Tablets, naltrexone hydrochloride 50 mg,
28-tab pack

1.5. INNE

Diamorphine

TABLETKI, diamorphine hydrochloride 10 mg, 100-tab pack

Dihydrocodeine dihydrocodeine tartrate 30 mg,
28-tab pack

DHC Continus - modyfikowane uwalnianie TABLETKI, m/r,
dihydrocodeine tartrate 60 mg, 56-tab pack; 90 mg, 56-tab pack; 120 mg,
56-tab pack

Tramadol Hydrochloride

Kapsułki, tramadol hydrochloride 50 mg, 30- kapsułek, 100-kapsułek

Zamadol ®

Krople doustne, chlorowodorek tramadolu 100 mg / ml
(2,5 mg / drop), 10 ml

Rozpadowi w jamie ustnej tabletki, tramadol hydrochloride 50 mg, 60-tab

Preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu 12-godzinne

Tramadol

Tabletki, m / r, chlorowodorek tramadolu 100 mg, 60 tabletek; 150 mg, 60
tabletek; 200 mg, 60 tabletek

Preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu 24-godzinne

Tramadol, tramadol hydrochloride 100 mg, 30 tabletek; 150 mg, 28 tabletek;
200 mg, 30 tabletek; 300 mg, 30 tabletek; 400 mg, 28 tabletek