Tabela 2.33-10. Czynniki ryzyka ŻChZZ u chorych hospitalizowanych[a] – Skala Padewska Oceny Ryzyka

czynna choroba nowotworowa (chorzy z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych lub z przerzutami odległymi, którzy otrzymali chemioterapię lub radioterapię w ciągu ostatnich 6 miesięcy)	3 pkt
przebyta ŻChZZ (poza zakrzepicą żył powierzchownych)	3 pkt
unieruchomienie (przewidywana konieczność przebywania w łóżku [z możliwością korzystania z łazienki/toalety] z powodu niesprawności chorego lub polecenia lekarza przez ≥3 dni)	3 pkt
rozpoznana trombofilia (niedobór antytrombiny, białka C lub S, czynnik V Leiden, mutacja G20210A genu protrombiny lub zespół antyfosfolipidowy)	3 pkt
niedawny (≤1 mies.) uraz lub zabieg operacyjny	2 pkt
wiek ≥70 lat	1 pkt
niewydolność serca lub niewydolność oddechowa	1 pkt
świeży zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu	1 pkt
ostre zakażenie lub choroba reumatologiczna	1 pkt
otyłość (BMI ≥30 kg/m^2)	1 pkt
leczenie hormonalne	1 pkt

Interpretacja: ≥4 punkty – duże ryzyko ŻChZZ

[a] na podstawie: Circulation, 2004; 110: 874–879

Copyright © 1995 - 2015 Medycyna Praktyczna