SCHEMAT BADANIA ORL

Nos, nosogardło i jama ustna

Nos i nosogardło

Oceniany obszar	Elementy opisu
Nos zewnętrzny	Prosty, krzywy lub zniekształcony. Nozdrza przednie wąskie lub szerokie.
Błona śluzowa	Różowa, zaczerwieniona lub zanikowa. Wilgotna, sucha lub obrzęknięta. Obecność wydzieliny. Inne zmiany.
Przegroda nosa	Prosta lub skrzywiona w lewo albo w prawo, w części przedniej lub tylnej. Listwa, kolec, próg, perforacja.
Małżowiny nosowe dolne	Osobna ocena po stronie prawej i lewej: prawidłowe, przerost lub obrzęk.
Drożność nosa	Prawidłowa lub upośledzona.
Nosogardło	Nie badano lub wolne. Ocena migdałka gardłowego, ujść trąbek słuchowych (wolne lub z wydzieliną) oraz drożności nozdrzy tylnych.


Jama ustna

Oceniany obszar	Elementy opisu
Błona śluzowa	Różowa, zaczerwieniona lub zanikowa. Wilgotna lub sucha. Inne zmiany.
Uzębienie	Uporządkowane, stosowne do wieku, próchnica, proteza.
Język	Prawidłowa ruchomość. Symetria lub asymetria. Nalot.
Podniebienie twarde	Prawidłowo wysklepione lub gotyckie.


Gardło

Oceniany obszar	Elementy opisu
Błona śluzowa gardła	Różowa, zaczerwieniona lub zanikowa. Wilgotna lub sucha. Inne zmiany.
Podniebienie miękkie	Symetria lub asymetria. Prawidłowa ruchomość. Wydłużony języczek.
Łuki podniebienne	Symetryczne lub wydłużone.
Migdałki podniebienne	Symetryczne lub asymetryczne (L > P albo P > L). Zanik, nalot.
Tylna ściana gardła	Błona śluzowa różowa, sucha lub wilgotna. Wydzielina, powiększone grudki chłonne.

Skala Mallampatiego (I–IV)



Ocena wielkości migdałków podniebiennych



Numeracja do weryfikacji: rycina pokazuje stopnie 0–4, a tabela w materiale źródłowym podaje 1–5.

Uszy, krtań i szyja

Uszy

Poniższe elementy należy opisać osobno dla ucha prawego i lewego.

Oceniany obszar	Elementy opisu
Małżowina uszna	Prawidłowa lub zniekształcona.
Przewód słuchowy zewnętrzny	Wolny, prawidłowy lub wąski. Woskowina, wydzielina.
Błona bębenkowa	Zachowana, perłowo-szara, z obecnym refleksem świetlnym, matowa, wciągnięta lub mleczna. Ruchomość w próbie Valsalvy. Perforacja brzeżna lub centralna. Inne zmiany.


Krtań w laryngoskopii pośredniej


Oceniany obszar	Elementy opisu
Ocena ogólna	Nie badano lub obraz anatomiczny i czynnościowy prawidłowy.
Błona śluzowa	Różowa lub zaczerwieniona, wilgotna lub sucha. Zaleganie wydzieliny.
Nagłośnia	Niezmieniona, opadająca lub zwinięta rurkowato.
Nalewki	Prawidłowe, obrzęk, zaczerwienienie.
Fałdy głosowe	Białawe, gładkie, z rysunkiem naczyń, obrzękięte, guzki głosowe, inne...

Szyja

Oceniany obszar	Elementy opisu
Tarczyca	Powiększona lub niepowiększona.
Węzły chłonne szyi	Powiększone lub niepowiększone – GRUPY

Węzły chłonne szyi





Region I

Region podbródkowy i podżuchwowy - węzły w trójkącie ograniczonym przednim brzuścem m. dwubrzuścowego i kością gnykową a ku tyłowi tylnym brzuścem m. dwubrzuścowego.

Region II

Górna grupa węzłów**(węzły szyjne górne)** żyły szyjnej wewnętrznej - położona wokół 1/3 górnej części żyły szyjnej wewnętrznej od podstawy czaszki do rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej (chirurgiczny pkt topograficzny) lub wysokości kości gnykowej (kliniczny pkt topograficzny).

Region III

Węzły zgrupowane wzdłuż **środkowej** części żyły szyjnej wewnętrznej - od rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej, ku dołowi do miejsca skrzyżowania m. łopatkowo-gnykowego z żyłą szyjną wewnętrzną (chirurgiczny pkt topograficzny) lub błony pierścienno-tarczowej (kliniczny pkt topograficzny).

Region IV

Grupa dolna węzłów żyły szyjnej wewnętrznej - od miejsca skrzyżowania m. łopatkowo-gnykowego z żyłą szyjną wewnętrzną do obojczyka. Granicę tylną regionu II, III i IV stanowi tylny brzeg m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Region V

Węzły zlokalizowane **w trójkącie tylnym szyi** - wzdłuż nerwu dodatkowego i tętnicy poprzecznej szyi, ku przodowi od m. czworobocznego. Granicę przednią stanowi tylny brzeg m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, granicę dolną obojczyk.

Region VI

Węzły otaczające trzewia szyi w linii środkowej (głębokie trzewne węzły **przy-około-tchawicze, przytarczowe, przedkrtaniowe**) - od poziomu kości gnykowej do wcięcia szyjnego mostka. Granicę boczną z każdej strony stanowi tętnica szyjna wspólna.

Region VII

Zawiera węzły w obrębie śródpiersia górnego od poziomu brzegu mostka do poziomu żyły ramienno-głowowej zamostkowo- ograniczone t.sz. wspólnymi